

A laboratóriumi diagnosztika aktuális kérdései

SM KMOK

Központi laboratórium

Dr. Juhász Attila

Vérvétel: Előjegyzési rendszer

Indokoltsága, előnyei:

- várakozás, tömeg, torlódás elkerülése,
- felesleges vizsgáltkérések csökkentése,
- szakmailag megalapozott vizsgáltkérések arányának növelése,
- finanszírozási egyensúly közelítése,
- **szakmailag indokolt vizsgálatok elérhetőségének növelése !!!**

Vérvétel: Előjegyzési rendszer

Elérhetősége:

- telefon: 7.30.-15.30., 06-82-501-357,
- **személyesen is: május 1-től,**
- MedSol: amint lehet, szólunk

- vérvétel háziorvosi beutalóval:
 - 7.30.-13.30. Kaposvár,
 - 7.30.-10.30. Mosdós,
- **maximált létszám: 200 eset (Kaposvár)**
40 eset (Mosdós)

Vérvétel: Előjegyzési rendszer

Kivételek: (nincs benne az esetkorlátban)

- várandósok,
- szállított idősek,
- mozgáskorlátozottak,
- gyermekek 14 éves korig

Vérvétel: Előjegyzési rendszer

- SÜRGŐSSÉGI INDIKÁCIÓ NINCSEN

- addig, amíg a szakma meg nem határozza magára, kötelező érvényűen melyek ezek a kórállapotok, addig saját hatáskörben kell megoldaniuk a vérvételt, mintaszállítást

TSH (jelenleg napi 30 eset)

Diagnosztikus teszként:

Mikor kérjük?

- hypo-, hypertyreozis gyanúja esetén, klinikum !!!
(pl.: indokoltalan hízás, fogyás, elbutulás, hajhullás, indokolatlan bradi-, tach-, normocardia, stb.)

Mikor ne kérjük?

- „nagy, súlyos betegség” esetén, csak felépülés után

Mikor ismételjük?

- th. megkezdése után 3 havonta, 2x elég is lehet

TSH

Szűrőtesztként csak magas rizikójú csoportokban:

- Újszülötteknél
- Thyreoidea megbetegedések halmozott családi előfordulása esetén
- Idős betegeken
- Post partum (4-8 héttel szülés után)
- Autoimmun betegek (pl. I. típusú diabetes, Addison kór)

Pajzsmirigy megbetegedések labordiagnosztikájának ajánlott algorithmusa háziorvosoknak

TSH alacsony/nem detektálható >>> fT3 mérés

fT3 magas >>> hyperthyreosis,

fT3 normál >>> hypertyreosis határesetete >>> ism 3-6 hónap

fT3 alacsony >>> beteg nem pm. beteg, euthyreoid

TSH normál >>> euthyreoid

TSH enyhén emelkedett >>> fT4 mérés

fT4 normál >>> kompenzált hypothyreosis >>> ismétlés 3-6 hónap múlva

fT4 csökkent >>> hypothyreosis

TSH emelkedett >>> hypothyreosis

Követés: TSH kérés ismétlése terápia esetén: 3 hónap múlva